



اطلاعیه ترویجی

شماره ۳

## توصیه های فنی مرحله داشت کلزا ویژه کاران

- ۱- بازدید منظم جهت بررسی وضعیت مزارع کلزا و شناسایی عوامل خسارتزا به ویژه آفاتی نظیر بیدکلم و شته مومی و در صورت لزوم در اسرع وقت مبارزه انجام گردد.
- ۲- در مناطق گرم، فرصت مصرف سولوپتاس تا اوایل پر شدن دانه به میزان ۲۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار همراه آب آبیاری یا ۷ کیلوگرم به صورت محلول پاشی می باشد.
- ۳- کلزا در مرحله گل دهی تا اواسط پر شدن دانه، نیاز آبی بالائی دارد و باید بسته به بافت خاک و اقلیم منطقه، دور آبیاری بین ۴ تا ۷ روز تنظیم گردد.
- ۴- در زمان تغییر رنگ غلاف ها و گرایش آن به زردکاهی (۵۰ درصد تغییر رنگ غلاف ها) جهت هم زمانی در رسیدگی بیشتر و عملیات برداشت با حداقل ضایعات (غلاف سبز نکوبیده و یا ریزش دانه) آبیاری قطع گردد.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان